

Dexatop LA



Antiinflamatorio corticoide
(Isonicotinato de dexametasona)
Uso Veterinario

Descripción: Corticoide con 10-14 días de altos niveles terapéuticos.

Composición: Cada ml contiene 3 mg de Dexametasona-21-isonicotinato, en una suspensión acuosa macrócristalina.

Indicaciones: Enfermedades del aparato locomotor, respiratorio, así como enfermedades cutáneas que precisen de una terapéutica corticoesteroidea. **Equinos:** Bronquitis crónica, enfisema alveolar pulmonar, dermatitis, eczemas, artritis y artrosis no sépticas, podotrocleosis, esguinces, claudicaciones de origen desconocido, sarna. **Bovinos:** Acetonemia, paresia puerperal, paraplejia ante y pospartum, tetanias, indigestiones, artritis no sépticas, tenosinovitis, bursitis. **Porcinos:** Agalactia, artritis no sépticas, eclampsia, intoxicaciones, enfermedad edematosas, prevención del shock. **Caninos y Felinos:** Pruritos inespecíficos eczemas y dermatitis, bronquitis crónica, asma bronquial, artritis no sépticas, esguinces.

Acción terapéutica: La corticoterapia requiere el uso de sustancias de acción potente, rápida, segura y de efecto duradero en determinadas enfermedades del aparato locomotor, sistema respiratorio y de piel. Dexatop LA posee estas propiedades gracias al tamaño de los cristales de la dexametasona.

La acción clínica de Dexatop LA se manifiesta a las 24 horas de su administración y se mantiene durante 10-14 días. Su tolerancia es muy buena, careciendo prácticamente de efectos secundarios. Incluso debe destacarse que después de su administración no se presentan problemas de infusión en equinos, como suele suceder tras la aplicación de otros corticoides.

Dosis y Administración: Suministrar por vía IM. **Equinos y bovinos:** 0,06 mg / kg p.v. (2 ml / 100 kg p.v.). **Porcinos, Ovejas y cabras:** 0,06 mg / kg p.v. (0,2 ml / 10 kg p.v.). **Perros Pequeños y gatos:** 0,30 mg / kg p.v. (0,1 ml / kg p.v.). **Perros (más de 20 Kg):** 0,22 mg / kg p.v. (0,075 ml / kg p.v.).

Especies: Equinos, Bovinos, Ovinos, Porcinos, Caninos, Felinos.

Advertencias: Agitar antes de usar. No exceder la dosis recomendada. Como otros corticoides, no debe ser administrado en casos de sospecha de osteoporosis, diabetes mellitus, micosis sistémica o infecciones virales, tuberculosis activa y en pacientes con hipersensibilidad al producto. En casos de infecciones bacterianas locales o generales debe administrarse conjuntamente con un tratamiento específico. También está contraindicado en pacientes con: procesos oftálmicos degenerativos, úlceras de cornea, síndrome de Cushing, insuficiencia renal y/o hepática o insuficiencia cardiaca congestiva. No administrar en hembras gestantes durante el último tercio de la gestación, ya que puede originar un parto prematuro seguido de distocia, muerte fetal, retención de placenta y metritis. No administrar en bovinos y ovinos en lactación. No administrar a equinos destinados a consumo humano. Conservar el producto entre 5 y 30° C. Evitar el congelamiento y el calor excesivo.

Mantener fuera del alcance de los niños. Centro Nacional de Intoxicaciones TE: 0800-333-0160.

Presentación: Frasco ampolla de 10 ml

Venta bajo receta.

SENASA Certif. N° 10-165 Estab. Elaborador N° 8.487

Interbio Pharma S.R.L. Av. L.N. Alem 1698 (2752) Capitán Sarmiento, Buenos Aires. Argentina.
Tel.: (54) 02478 48-2373 · Web: www.interbio.com.ar · E-mail: info@interbio.com.ar.

Director Técnico: Dr. Jorge Casim. M.V. M.P. N° 9.093